

Agria.

Een laat, geelvezig verwerkingsras met een goede opbrengst en een zeer stabiele kwaliteit.

- ▶ Goede bakkwaliteit
- ▶ Brede virusresistenties
- ▶ Goede bewaarbaarheid



MARKTSEGMENT



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Böhm
 Kruising: QUARTA x SEMLO
 Zaailing: BM 77-0945
 Kwekersrecht: Verlopen

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: laat / 5
 Kiemkleur: blauw paars
 Bloemkleur: wit
 Hoeveelheid bessen: zeer veel / 8
 Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
 Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
 Loof - selecteerbaarheid: vrij makkelijk / 7
 Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Vleeskleur: geel / 7
 Schilkleur: geel
 Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
 Knolgrootte: grof / 8
 Knolvorm: ovaal lang
 Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
 Knolzetting: vrij laag / 5
 Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: lang / 8
 Metribuzin: weinig gevoelig / 7,5
 Bentazon: redelijk gevoelig / 6,5
 Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6
 Talent: 25% meer knollen / 8

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
 Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
 Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6
 Rooibeschatting: gevoelig / 5

Onderwatergewicht: 402
 Drogstofgehalte: 21,8%
 Drogstofverdeling: gemiddeld / 6,5
 TGA-gehalte: 2,7

Chipskwaliteit: goed / 7
 Frietkwaliteit: uitstekend / 8
 Kooktype: kruimig / BC
 Rauwverkleuring: weinig gevoelig / 7
 Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7



www.agrico.nl/agria

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Een korte warmtestoot of goed voorkiemen wordt aanbevolen. Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting.

Plantafstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

50/55 mm: 40 cm (33.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema wordt geadviseerd.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor lange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: vatbaar / 2

Aardappelmoeheid Pa 3: vatbaar / 2

Phytophthora loof: vatbaar / 5,5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7

Schurft: zeer vatbaar / 4,5

Poederschurft: zeer vatbaar / 3

Fusarium: weinig vatbaar / 6,5

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: - / -

Kringerigheid: weinig vatbaar / 7

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 6

Virus - A: weinig tot niet vatbaar / 9

Virus - X: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1): weinig vatbaar / 9

Wratziekte F6 (O1): matig vatbaar / 6

Wratziekte F18 (T1): - / -