


Spectra.

MARKTSEGMENT




Een midden vroeg, hoog opbrengend consumptieras met een zeer regelmatige knolvorm en een mooie schilhoedanigheid.

- ▶ Grove knollen
- ▶ Hoge knolzetting
- ▶ Regelmatige sortering



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: ARIELLE x SOFIA
Zaailing: SW 05-1431
Kwekersrecht: 31-12-2046

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenvroeg / 7
Kiemkleur: rood paars
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: geen / 4
Loof - ontwikkeling begin: snel / 8
Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5
Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6
Loof - stevigheid plant: gemiddeld / 6,5

Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: zeer goed / 7,5
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Knolvorm: ovaal rond
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7,5
Knolzetting: vrij hoog / 7
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: vrij kort / 5
Metribuzin: redelijk gevoelig / 6,5
Bentazon: weinig tot niet gevoelig / 8
Ethyleen: 5% minder tot 5% meer knollen / 5
Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Groescheuren: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7,5
Rooibeschatiging: redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht: 324
Drogstofgehalte: 17,9%
Drogstofverdeling: - / -
TGA-gehalte: 4,7

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
Frietkwaliteit: niet geschikt / 4,5
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring: zeer gevoelig / 4
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6



www.agrico.nl/spectra

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)

Het advies is om Spectra wat dieper te poten met een goede rugbedekking om groenverkleuring te voorkomen.

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken en kan enige opbrengstderving geven.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4,5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6

Schurft: vatbaar / 5

Poederschurft: zeer vatbaar / 4

Fusarium: vatbaar / 5,5

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: vatbaar / 5

Kringerigheid: vatbaar / 5

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 6

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): licht vatbaar* / 7*

Wratziekte F18 (T1): - / -

* Resultaten met een '**' zijn op basis van eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd.