

Een midden vroeg, hoogopbrengend consumptieras met een heldere schil en een regelmatige sortering.

- ✓ Grove knollen
- ✓ Vrij vastkokende aardappel
- ✓ Goede droogtetolerantie



## Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Lantmännen Seed B.V.
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2029
- ⦿ **Kruising:** BM 77-2102 x AR 80-031-20
- ⦿ **Zaailingnummer:** SW 87-1037

## Marktsegment

- ⦿ **Traditioneel**
- ⦿ **Retail** | Vers



## Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden vroeg / 6,5
Bloemkleur	licht paars
Hoeveelheid bessen	vrij weinig / 5
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7
Loof: - ontwikkeling volledig	vrij snel / 7
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6,5
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7

Vleeskleur	licht geel / 6
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	vrij goed / 6,5
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	grof / 8
Knolvorm	ovaal lang
Regelmaat knolvorm	vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting	gemiddeld / 6
Regelmaat sortering	regelmatig / 7

## Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 5,5
Metribuzin	weinig gevoelig / 7
Bentazon	niet getest / -
Talent	5% tot 15% meer knollen / 6
Ethyleen	5% tot 15% meer knollen / 6

Doorwas	redelijk gevoelig / 6,5
Groeischeuren	weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7
Rooibeschaadiging	redelijk gevoelig / 6,5

Onderwatergewicht	347
Drogestofgehalte	19,1%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	-

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	onvoldoende / 4
Kooktype	vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring	gevoelig / 5,5
Grauwverkleuring (na koken)	weinig gevoelig / 7

Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	zeer vatbaar / 4,5
Phytophthora knol	vatbaar / 5,5

Schurft	vatbaar / 5,5
Poederschurft	zeer vatbaar / 2
Fusarium	weinig vatbaar / 6
Erwinia	vatbaar / 5
Zwarte spikkel	vatbaar / 5,5
Kringerigheid	vatbaar / 5

Virus Bladrol	weinig vatbaar / 7
Virus A	niet getest / -
Virus X	niet getest / -
Virus Yn	vatbaar / 5,5
Virus Yntn	weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

## Bemesting<sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies - 10%
Fosfaat: standaard advies
Kalium: standaard advies

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

## Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.  
Poot niet direct vanuit de koeling. Warm het pootgoed tijdig op voor potten.

## Plantafstand

28/35: 20 cm (67000 planten/ha)  
35/55: 27 cm (50000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan enige loofreactie geven maar zelden opbrengstderving.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Almera zeer vatbaar is.

## Oogst

Almera is enigzins gevoelig voor rooibeschatiging, maar weinig gevoelig voor stootblauw. Indien mogelijk twee weken af laten harden.

## Bewaring

Almera heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor de middenlange bewaring (6 maanden).

Say  
growth,  
say **Agrico.**

## Agrico