

Levante.

MARKTSEGMENT



Een middenlaat, hoogopbrengend consumptieras met een mooie, gele huid en Phytophthora resistentie in loof en knol.

- ▶ Hoge knolzetting
- ▶ Mooie presentatie
- ▶ Goede bewaarbaarheid



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 01-3218 x ALMERA
Zaailing: AR 07-3009
Kwekersrecht: 31-12-2048

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenlaat / 5,5
Kiemkleur: groen rood
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 5,5
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolgrootte: vrij grof / 7
Knolvorm: lang ovaal
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: hoog / 8
Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: gemiddeld / 6,5
Metribuzin: weinig gevoelig / 7
Bentazon: weinig gevoelig / 7
Ethyleen: 5% minder knollen / 4
Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6

Doorwas: weinig gevoelig / 7
Groescheuren: weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6,5
Rooibeschatiging: redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht: 365
Drogstofgehalte: 19,9%
Drogstofverdeling: - / -
TGA-gehalte: 4,73

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4,5
Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5
Kooktype: vrij kruimig / B
Rauwverkleuring: gevoelig / 5,5
Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7



www.agrico.nl/levante

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)

35/55 mm: 27 cm (49.500 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Ondanks de phytophthora resistentie, blijf alert voor infecties.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor middellange tot lange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 8,5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7,5

Schurft: vatbaar / 5

Poederschurft: weinig vatbaar / 6,5

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 7,5

Kringerigheid: zeer vatbaar / 4,5

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 6

Virus - Yntn: weinig tot niet vatbaar / 8,5

Wratziekte F1 (D1): - / -

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -