

Andean Sunside.

Rasbeschrijving consumptie / 1-2

Een laat rijpende diploïde tafelspecialiteit met een krachtige aardappelsmaak en een hoog gehalte aan carotenoïden.

- ✓ Oranje vleeskleur
- ✓ Kruidig kooktype
- ✓ Vrij hoge knolzetting



Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Agrico Research B.V.
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2042
- ⦿ **Kruising:** ARD 89-01402 x ARD 88-00883
- ⦿ **Zaailingnummer:** ARD 95-2058

Marktsegment

- ⦿ **Retail** | Speciaal

R

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	laat / 4
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	gemiddeld / 6
Loof: - ontwikkeling volledig	vrij snel / 7
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7

Vleeskleur	oranje / 8,5
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	vrij goed / 6,5
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	vrij grof / 7
Knolvorm	ovaal
Regelmaat knolvorm	onregelmatig / 5
Knolzetting	vrij hoog / 7
Regelmaat sortering	vrij regelmatig / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	kort / 4
Metribuzin	weinig gevoelig / 7
Bentazon	redelijk gevoelig / 6
Talent	5% tot 15% meer knollen / 6
Ethyleen	niet getest / -

Doorwas	redelijk gevoelig / 6
Groei scheuren	weinig tot niet gevoelig / 8
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7
Rooibeschaadiging	gevoelig / 5

Onderwatergewicht	439
Drogestofgehalte	23,6%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	2,3

Chipskwaliteit	matig / 5,5
Frietkwaliteit	gemiddeld / 6
Kooktype	kruidig / BC
Rauwverkleuring	redelijk gevoelig / 6,5
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6

Say potato,
say **Agrico.**

Andean Sunside.

Rasbeschrijving consumptie / 2-2

Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	weinig tot niet vatbaar / 8
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 6

Schurft	zeer vatbaar / 4
Poederschurft	weinig vatbaar / 6
Fusarium	niet getest / -
Erwinia	weinig tot niet vatbaar / 8
Zwarte spikkel	vatbaar / 5
Kringrigheid	weinig vatbaar / 6

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	vatbaar / 5
Virus Yn	vatbaar / 5
Virus Yntn	weinig vatbaar / 6

Wratziekte F1 (D1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 5%
Fosfaat: standaard advies
Kalium: standaard advies + 20%, om het onderwatergewicht enigszins te verlagen.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Maximaal 2x afkiemen.
Goede kiemstimulering (warmtestoot) om dominantie te verbreken.

Plantafstand

28/35: 20 cm (67000 planten/ha)
35/55: 25 cm (54000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan enige loofreactie geven maar zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, alhoewel Andean Sunside vrij resistent is.

Oogst

Andean Sunside is weinig gevoelig voor stootblauw en vrij gevoelig voor rooibeschadiging, indien mogelijk minimaal 3 weken af laten harden.

Bewaring

Andean Sunside heeft een zeer zwakke kiemrust en is alleen geschikt voor af land levering en korte bewaring.

Say
growth,
say **Agrico.**

Agrico