

Twister.

Rasbeschrijving consumptie / 1-2



Een midden vroeg consumptieras, geschikt voor de gangbare en biologische teelt, met een goede opbrengst en Phytophthora resistentie in loof en knol.

- ✓ Mooie presentatie
- ✓ Goede bewaarbaarheid
- ✓ Vrij vastkokend

Algemene kenmerken

- ⊙ **Kweker:** G.W. te Winkel
- ⊙ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2048
- ⊙ **Kruising:** ARG 96-0739 x AR 02-9113
- ⊙ **Zaailingnummer:** TW 08-1507

Marktsegment

- ⊙ **Traditioneel**
- ⊙ **Retail** | Vers
- ⊙ **Geschikt voor de biologische teelt**



Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden vroeg / 7
Bloemkleur	licht paars
Hoeveelheid bessen	vrij weinig / 5,5
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7
Loof: - ontwikkeling volledig	vrij snel / 7,5
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6,5
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7

Vleeskleur	licht geel / 6,5
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	goed / 7
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	vrij grof / 7
Knolvorm	rond ovaal
Regelmaat knolvorm	regelmatig / 7
Knolzetting	gemiddeld / 6
Regelmaat sortering	vrij regelmatig / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	vrij lang / 7
Metribuzin	zeer gevoelig / 3
Bentazon	redelijk gevoelig / 6
Talent	gemiddeld 15% tot 25% meer knollen / 7
Ethyleen	gemiddeld -5% minder knollen / 4

Doorwas	redelijk gevoelig / 6,5
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid	weinig tot niet gevoelig / 8
Rooibeschaadiging	weinig gevoelig / 7

Onderwatergewicht	345
Drogestofgehalte	19%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	5,63

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	matig / 5
Kooktype	vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring	redelijk gevoelig / 6
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6,5

Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	weinig tot niet vatbaar / 9
Phytophthora knol	weinig tot niet vatbaar / 9

Schurft	weinig vatbaar / 6
Poederschurft	vatbaar / 5
Fusarium	weinig vatbaar / 6
Erwinia	niet getest / -
Zwarte spikkel	weinig vatbaar / 7
Kringrigheid	weinig vatbaar / 6

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	niet getest / -
Virus Yn	weinig tot niet vatbaar / 8
Virus Yntn	weinig tot niet vatbaar / 8

Wratziekte F1 (D1)	licht vatbaar / 8
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies +20%
Fosfaat: standaard advies
Kalium: standaard advies

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.
Weinig verschil in diverse pootgoed behandelingen

Plantafstand

28/35: 22 cm (60500 planten/ha)
35/50: 25 cm (54000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin wordt afgeraden, dit geeft vaak een flinke loofreactie en forse opbrengstderiving.

Schimmels

Twister heeft een zeer goede Phytophthora resistentie in loof en knol.

Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdoding is meestal voldoende, omdat Twister weinig gevoelig is voor rooibescha- diging en niet gevoelig voor stootblauw.

Bewaring

Twister heeft een goede kiemrust en is geschikt voor midden- lange tot lange bewaring bij 5-6 graden Celsius.

Say
growth,
say **Agrico.**

Agrico