

Een middenlaat consumptieras met goede hitte- en virusresistenties en een hoge opbrengst.

- ✓ Grove knollen
- ✓ Midden late rijptijd
- ✓ Hoog onderwatergewicht



## Algemene kenmerken

- **Kweker:** J. Oldenburger
- **Kwekersrecht EU:** verlopen
- **Kruising:** BEA x USDA 96-56
- **Zaailingnummer:** Oldenburger 57-88

## Marktsegment

- **Traditioneel**

T

## Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden laat / 6
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	gemiddeld / 6,5
Loof: - ontwikkeling begin	snel / 8
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6,5
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7,5

Vleeskleur	licht geel / 6
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	vrij goed / 6
Kiemkleur	blauw paars
Knolgrootte	grof / 8
Knolvorm	lang
Regelmaat knolvorm	vrij regelmatig / 6
Knolzetting	gemiddeld / 6
Regelmaat sortering	regelmatig / 7

## Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 6
Metribuzin	weinig tot niet gevoelig / 8
Bentazon	niet getest / -
Talent	5% minder tot 5% meer knollen / 5
Ethyleen	niet getest / -

Doorwas	redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren	weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7
Rooibeschaadiging	zeer gevoelig / 4

Onderwatergewicht	387
Drogestofgehalte	21%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	-

Chipskwaliteit	matig / 5,5
Frietkwaliteit	gemiddeld / 6
Kooktype	kruimig / BC
Rauwverkleuring	niet getest / -
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6,5

Say potato,  
say **Agrico.**

# Spunta.

## Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	vatbaar / 2
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	vatbaar / 2

Phytophthora loof	vatbaar / 5,5
Phytophthora knol	vatbaar / 5

Schurft	vatbaar / 5
Poederschurft	vatbaar / 5
Fusarium	vatbaar / 5,5
Erwinia	vatbaar / 5
Zwarte spikkel	niet getest / -
Kringerigheid	weinig vatbaar / 6

Virus Bladrol	weinig vatbaar / 6
Virus A	weinig tot niet vatbaar / 9
Virus X	weinig vatbaar / 6,5
Virus Yn	weinig vatbaar / 6
Virus Yntn	weinig vatbaar / 6

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

## Bemesting<sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies - 10%  
 Fosfaat: standaard advies  
 Kalium: standaard advies + 10%

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

## Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.  
 Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken. Voorkiemen alvorens het poten geeft een betere knolzetting.

## Plantafstand

28/35: 27 cm (50000 planten/ha)  
 35/55: 33 cm (40000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin levert geen problemen op.

## Schimmels

Een preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, alhoewel Spunta vatbaar is.

## Oogst

Minimaal drie weken wachten met rooien na loofdoding, omdat Spunta zeer gevoelig is voor rooibeschadiging, maar weinig gevoelig voor stootblauw.

## Bewaring

Spunta heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor de middenlange bewaring (6 maanden).

Say  
 growth,  
 say **Agrico.**

## Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands  
 Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands  
 T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl  
[www.agrigo.nl](http://www.agrigo.nl)