

Severina.

Rasbeschrijving consumptie / 1-2

Een midden vroeg consumptieras met een goede opbrengst en een mooie heldere schil.

- ✓ Grove knollen
- ✓ Vrij vastkokend
- ✓ Goede schilhoedanigheid



Algemene kenmerken

- ⊙ **Kweker:** Konst Research B.V.
- ⊙ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2049
- ⊙ **Kruising:** AR 00-0093 x MARIANNE
- ⊙ **Zaailingnummer:** KO 08-1715

Marktsegment

- ⊙ **Traditioneel**

T

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden vroeg / 7
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7,5
Loof: - ontwikkeling volledig	vrij snel / 7,5
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6,5
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7

Vleeskleur	licht geel / 6
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	goed / 7
Kiemkleur	blauw paars
Knolgrootte	grof / 8
Knolvorm	ovaal
Regelmaat knolvorm	regelmatig / 7
Knolzetting	gemiddeld / 6
Regelmaat sortering	vrij regelmatig / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	vrij kort / 5
Metribuzin	redelijk gevoelig / 6
Bentazon	gevoelig / 5,5
Talent	25% meer knollen / 8
Ethyleen	5% minder knollen / 4

Doorwas	redelijk gevoelig / 6,5
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid	redelijk gevoelig / 6
Rooibeschaadiging	redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht	326
Drogestofgehalte	18%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	7,61

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	onvoldoende / 4
Kooktype	vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring	niet getest / -
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6

Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	zeer vatbaar / 3,5
Phytophthora knol	vatbaar / 5

Schurft	vatbaar / 5,5
Poederschurft	weinig vatbaar / 7,5
Fusarium	weinig vatbaar / 6,5
Erwinia	niet getest / -
Zwarte spikkel	weinig vatbaar / 6
Kringerigheid	zeer vatbaar / 4,5

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	niet getest / -
Virus Yn	weinig tot niet vatbaar / 8
Virus Yntn	weinig vatbaar / 6

Wratziekte F1 (D1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies
Fosfaat: standaard advies
Kalium: standaard advies + 25%

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.
Severina kan direct uit de koeling worden gepoot, liefst met een warmtestoot.

Plantafstand

28/35: 25 cm (60500 planten/ha)
35/55: 30 cm (54000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan een loofreactie geven en enige opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Severina vatbaar is.

Oogst

Severina is vrij gevoelig voor rooibeschatiging en stootblauw, wacht in ieder geval 2 weken na de loofvernietiging voor het rooien.

Bewaring

Severina is met name geschikt voor af land leveringen of korte bewaring (4 maanden).

Say
growth,
say **Agrico.**