

# Twinner.

Rasbeschrijving consumptie / 1-2



Een vroeg consumptieras, geschikt voor de gangbare en biologische teelt, met vroeg een goede opbrengst en Phytophthora resistentie in loof en knol.

- ✓ Grove knollen
- ✓ Mooie presentatie
- ✓ Vrij vastkokend

## Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** G.W. te Winkel
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2046
- ⦿ **Kruising:** MA 98-0032 x AR 00-87-22
- ⦿ **Zaailingnummer:** TW 07-0807

## Marktsegment

- ⦿ **Traditioneel**
- ⦿ **Retail** | Vers
- ⦿ **Geschikt voor de biologische teelt**



## Plant- en knolkenmerken

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Rijptijd                      | vroeg / 7,5     |
| Bloemkleur                    | wit             |
| Hoeveelheid bessen            | weinig / 4,5    |
| Loof: - ontwikkeling begin    | vrij snel / 7,5 |
| Loof: - ontwikkeling volledig | vrij snel / 7   |
| Loof: - selecteerbaarheid     | gemiddeld / 6   |
| Loof: - stevigheid plant      | vrij stevig / 7 |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Vleeskleur          | geel / 7              |
| Schilkleur          | geel                  |
| Schilhoedanigheid   | goed / 7              |
| Kiemkleur           | rood paars            |
| Knolgrootte         | vrij grof / 7,5       |
| Knolvorm            | ovaal                 |
| Regelmaat knolvorm  | regelmatig / 7        |
| Knolzetting         | matig / 5             |
| Regelmaat sortering | vrij regelmatig / 6,5 |

## Gevoeligheid en kwaliteit

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Kiemrust   | gemiddeld / 6                |
| Metribuzin | redelijk gevoelig / 6,5      |
| Bentazon   | weinig gevoelig / 7          |
| Talent     | 25% meer knollen / 8         |
| Ethyleen   | 15% tot 25% meer knollen / 7 |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Doorwas           | redelijk gevoelig / 6,5 |
| Groeischeuren     | weinig gevoelig / 7     |
| Blauwgevoeligheid | weinig gevoelig / 7,5   |
| Rooibeschaadiging | redelijk gevoelig / 6,5 |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Onderwatergewicht   | 359             |
| Drogestofgehalte    | 19,7%           |
| Drogestof verdeling | niet getest / - |
| TGA - gehalte       | 7,8             |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Chipskwaliteit              | matig / 5               |
| Frietkwaliteit              | gemiddeld / 6,5         |
| Kooktype                    | vrij vastkokend / AB    |
| Rauwverkleuring             | redelijk gevoelig / 6   |
| Grauwverkleuring (na koken) | redelijk gevoelig / 6,5 |

Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistenties

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F) | resistent / 9     |
| Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C) | niet aanwezig / - |
| Aardappelmoeheid Pa 2 (D)     | niet aanwezig / - |
| Aardappelmoeheid Pa 3 (E)     | niet aanwezig / - |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Phytophthora loof | weinig tot niet vatbaar / 8 |
| Phytophthora knol | weinig tot niet vatbaar / 9 |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Schurft        | vatbaar / 5,5        |
| Poederschurft  | zeer vatbaar / 4     |
| Fusarium       | weinig vatbaar / 6   |
| Erwinia        | niet getest / -      |
| Zwarte spikkel | weinig vatbaar / 6,5 |
| Kringrigheid   | weinig vatbaar / 6   |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Virus Bladrol | niet getest / -    |
| Virus A       | niet getest / -    |
| Virus X       | niet getest / -    |
| Virus Yn      | weinig vatbaar / 7 |
| Virus Yntn    | zeer vatbaar / 4   |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Wratziekte F1 (D1)  | resistent / 10    |
| Wratziekte F6 (O1)  | niet aanwezig / - |
| Wratziekte F18 (T1) | niet aanwezig / - |

## Bemesting<sup>1</sup>

|                                 |
|---------------------------------|
| Stikstof: standaard advies +15% |
| Fosfaat: standaard advies       |
| Kalium: standaard advies        |

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

## Pootgoedbehandeling

Twinner heeft een snelle start na kiemen. Niet te vroeg poten, bij voorkeur in warme grond. Kan vanuit de koeling worden gepoot.

## Plantafstand

|                                 |
|---------------------------------|
| 28/35: 22 cm (60500 planten/ha) |
| 35/50: 25 cm (54000 planten/ha) |

## Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan een loofreactie geven en enige opbrengstderving.

## Schimmels

Twinner heeft een goede Phytophthora resistentie in loof en knol. Weinig gevoelig voor Alternaria.

## Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdding is meestal voldoende, omdat Twinner weinig gevoelig is stootblauw en vrij gevoelig voor rooibeschatiging.

## Bewaring

Twinner heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor de middenlange bewaring (6 maanden) bij 4,5 graden Celsius.

Say  
growth,  
say **Agrico.**

## Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl

[www.agrigo.nl](http://www.agrigo.nl)