

Ditta.

Een veelzijdig, middenlaat tafelen saladeras, geschikt voor gangbare en biologische teelt.



MARKTSEGMENT



- ▶ **Uitstekende consumptie kwaliteit**
- ▶ **Goede bewaarbaarheid**
- ▶ **Brede resistenties**



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Nieder Österreichische Saatbaugenossenschaft
Kruising: BINTJE x QUARTA
Zaailing: SW 80-0540
Kwekersrecht: 31-12-2023

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenlaat / 6
Kiemkleur: blauw paars
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: geen / 4
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6,5
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolgrootte: vrij grof / 7
Knolvorm: lang ovaal
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: vrij hoog / 7
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: vrij lang / 7
Metribuzin: weinig gevoelig / 7
Bentazon: redelijk gevoelig / 6,5
Ethyleen: - / -
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Groei scheuren: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
Rooibeschatting: gevoelig / 5,5

Onderwatergewicht: 369
Drogstofgehalte: 20,2%
Drogstofverdeling: - / -
TGA-gehalte: -

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5
Kooktype: vastkokend / A
Rauwverkleuring: zeer gevoelig / 4
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6



www.agrico.nl/ditta

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)

35/50 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: vatbaar / 5,5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: weinig vatbaar / 6,5

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Erwinia: weinig vatbaar / 7

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 6

Kringerigheid: vatbaar / 5

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 7

Virus - A: weinig tot niet vatbaar / 9

Virus - X: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yn: weinig vatbaar / 7,5

Virus - Yntn: vatbaar / 5

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -