

Een middenlaat chipsras met een goede opbrengst en een goed onderwatergewicht.

- ✓ Goede chipskwaliteit
- ✓ Goede bewaarbaarheid
- ✓ Midden late rijptijd



Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Agrico Research B.V.
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2046
- ⦿ **Kruising:** LADY CLAIR x ARG 96-0865
- ⦿ **Zaailingnummer:** AR 05-1887

Marktsegment

- ⦿ **Verwerkende industrie** | Chips

P

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden laat / 5,5
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7,5

Vleeskleur	licht geel / 6,5
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	gemiddeld / 5,5
Kiemkleur	donker rood paars
Knolgrootte	vrij grof / 7,5
Knolvorm	rond ovaal
Regelmaat knolvorm	regelmatig / 7
Knolzetting	vrij hoog / 7
Regelmaat sortering	regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	vrij lang / 7
Metribuzin	weinig gevoelig / 7
Bentazon	weinig gevoelig / 7
Talent	25% meer knollen / 8
Ethyleen	15% tot 25% meer knollen / 7

Doorwas	redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7
Rooibeschaadiging	redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht	441
Drogestofgehalte	23,7%
Drogestof verdeling	gemiddeld / 6,5
TGA - gehalte	5,33

Chipskwaliteit	uitstekend / 8
Frietkwaliteit	matig / 6
Kooktype	kruimig / C
Rauwverkleuring	gevoelig / 5
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6

Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	vatbaar / 5,5
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 6,5

Schurft	weinig vatbaar / 7
Poederschurft	zeer vatbaar / 4,5
Fusarium	weinig vatbaar / 7
Erwinia	niet getest / -
Zwarte spikkel	vatbaar / 5,5
Kringerigheid	zeer vatbaar / 4

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	niet getest / -
Virus Yn	weinig vatbaar / 6
Virus Yntn	vatbaar / 5,5

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 10%
Fosfaat: standaard advies
Kalium: standaard advies

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken. Voorkiemen alvorens het poten geeft een betere knolzetting. Eventueel 1x afkiemen.

Plantafstand

28/35: 25 cm (54000 planten/ha)
35/55: 30 cm (45000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan enige loofreactie geven maar zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Corsica vrij vatbaar is.

Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdding is meestal voldoende, omdat Corsica weinig gevoelig is voor stootblauw en vrij gevoelig voor rooibeschatiging.

Bewaring

Corsica heeft een goede kiemrust en is geschikt voor lange bewaring bij 9 graden Celsius.

Say
growth,
say **Agrico.**

Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands
Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands
T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl
www.agrigo.nl