

Een midden vroeg consumptieras met grove knollen, een hoge opbrengst en geschikt voor de 'baker'-markt.

- ✓ Vrij vastkokend
- ✓ Midden vroege rijptijd
- ✓ Goede virusresistenties



Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Konst Research B.V.
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** verlopen
- ⦿ **Kruising:** PRIMURA x KO 51-0123
- ⦿ **Zaailingnummer:** KO 66-0384

Marktsegment

- ⦿ **Traditioneel**
- ⦿ **Retail** | Vers



Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden vroeg / 6,5
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	gemiddeld / 6
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7
Loof: - ontwikkeling volledig	vrij snel / 7,5
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7

Vleeskleur	licht geel / 6
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	gemiddeld / 5,5
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	vrij grof / 7,5
Knolvorm	ovaal rond
Regelmaat knolvorm	vrij regelmatig / 6
Knolzetting	matig / 5
Regelmaat sortering	vrij regelmatig / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 5,5
Metribuzin	weinig tot niet gevoelig / 8
Bentazon	niet getest / -
Talent	5% tot 15% meer knollen / 6
Ethyleen	5% minder tot 5% meer knollen / 5

Doorwas	redelijk gevoelig / 6,5
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid	redelijk gevoelig / 6,5
Rooibeschaadiging	redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht	349
Drogestofgehalte	19,2%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	-

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4,5
Frietkwaliteit	matig / 5
Kooktype	vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring	redelijk gevoelig / 6
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6

Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	vatbaar / 5
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 7

Schurft	zeer vatbaar / 4,5
Poederschurft	weinig vatbaar / 6
Fusarium	vatbaar / 5,5
Erwinia	weinig vatbaar / 6
Zwarte spikkel	vatbaar / 5
Kringerigheid	vatbaar / 5

Virus Bladrol	weinig vatbaar / 6
Virus A	weinig tot niet vatbaar / 8
Virus X	weinig vatbaar / 7
Virus Yn	weinig vatbaar / 7
Virus Yntn	weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 10%
Fosfaat: standaard advies
Kalium: standaard advies + 10%

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.
Kan vanuit de koeling worden gepoot.

Plantafstand

28/35: 22 cm (60500 planten/ha)
35/55: 27 cm (50000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin levert geen problemen op.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Marfona vatbaar is.

Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdoding is meestal voldoende, omdat Marfona vrij gevoelig is voor rooibeschatiging en stootblauw.

Bewaring

Marfona heeft een gemiddelde kiemrust en is geschikt voor middenlange bewaring bij 4 graden Celsius.

Say
growth,
say **Agrico.**

Agrico