

Een laat consumptieras met een gele schil, aansprekende rode ogen, goede schurftresistentie en zeer geschikt voor lange bewaring.

- ✓ Hoge opbrengst
- ✓ Goede droogtetolerantie
- ✓ Weinig gevoelig voor blauw en beschadiging



## Algemene kenmerken

- ⊙ **Kweker:** Duoplant V.O.F.
- ⊙ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2022
- ⊙ **Kruising:** CARA x AUSONIA
- ⊙ **Zaailingnummer:** HB 81-0036

## Marktsegment

- ⊙ **Traditioneel**

T

## Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	laat / 5
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	gemiddeld / 6,5
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7,5

## Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	lang / 8
Metribuzin	redelijk gevoelig / 6
Bentazon	niet getest / -
Talent	15% tot 25% meer knollen / 7
Ethyleen	5% minder tot 5% meer knollen / 5

Vleeskleur	licht geel / 6
Schilkleur	geel met rood
Schilhoedanigheid	vrij goed / 6
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	grof / 8
Knolvorm	ovaal
Regelmaat knolvorm	vrij regelmatig / 6
Knolzetting	gemiddeld / 6
Regelmaat sortering	regelmatig / 7

Doorwas	redelijk gevoelig / 6,5
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7
Rooibeschaadiging	redelijk gevoelig / 6,5

Onderwatergewicht	381
Drogestofgehalte	20,8%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	1,9

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	matig / 5
Kooktype	vrij kruimig / B
Rauwverkleuring	niet getest / -
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6,5

Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	vatbaar / 5
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 7

Schurft	weinig vatbaar / 7
Poederschurft	vatbaar / 5
Fusarium	weinig vatbaar / 7
Erwinia	vatbaar / 5
Zwarte spikkel	niet getest / -
Kringrigheid	vatbaar / 5

Virus Bladrol	vatbaar / 5
Virus A	niet getest / -
Virus X	weinig tot niet vatbaar / 9
Virus Yn	weinig tot niet vatbaar / 8
Virus Yntn	vatbaar / 5

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	matig vatbaar / 5
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

## Bemesting<sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies + 5%  
Fosfaat: standaard advies  
Kalium: standaard advies

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

## Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.  
Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken. Voorkiemen alvorens het poten geeft een betere knolzetting.

## Plantafstand

28/35: 27 cm (50000 planten/ha)  
35/55: 33 cm (40000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan een loofreactie geven en enige opbrengstderving.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Picasso vrij vatbaar is.

## Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdding is meestal voldoende, omdat Picasso weinig gevoelig is voor stootblauw en vrij gevoelig voor rooibeschatiging.

## Bewaring

Picasso heeft een lange kiemrust en is geschikt voor lange bewaring bij 4 graden Celsius.

Say  
growth,  
say **Agrico.**

## Agrico