

Agata.

Een zeer vroeg, vrij vastkokend consumptieras met een mooie gladde schil en een hoge opbrengst.

- ✓ Zeer vroege rijptijd
- ✓ Goede virusresistenties
- ✓ Weinig gevoelig voor blauw en beschadiging



Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Lantmännen Seed B.V.
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** verlopen
- ⦿ **Kruising:** BM 72-0052 x SIRCO
- ⦿ **Zaailingnummer:** GE 77-0134

Marktsegment

- ⦿ **Traditioneel**
- ⦿ **Retail** | Vers



Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	zeer vroeg / 8
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	vrij weinig / 5
Loof: - ontwikkeling begin	snel / 8
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6,5
Loof: - stevigheid plant	gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	kort / 4
Metribuzin	redelijk gevoelig / 8
Bentazon	niet getest / -
Talent	5% minder tot 5% meer knollen / 5
Ethyleen	vanwege mutant vorming wordt gebruik van talent afgeraden
	5% minder tot 5% meer knollen / 5

Vleeskleur	licht geel / 6
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	goed / 7
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	vrij grof / 7
Knolvorm	ovaal
Regelmaat knolvorm	regelmatig / 7
Knolzetting	hoog / 8
Regelmaat sortering	vrij regelmatig / 6

Doorwas	redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid	weinig tot niet gevoelig / 8
Rooibeschaadiging	weinig gevoelig / 7

Onderwatergewicht	316
Drogestofgehalte	17,6%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	8

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	onvoldoende / 4
Kooktype	vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring	redelijk gevoelig / 6,5
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6

Say potato,
say **Agrico.**

Agata.

Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	vatbaar / 5
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 6

Schurft	vatbaar / 5
Poederschurft	weinig vatbaar / 6
Fusarium	vatbaar / 5
Erwinia	vatbaar / 5
Zwarte spikkel	weinig vatbaar / 6,5
Kringrigheid	weinig vatbaar / 6,5

Virus Bladrol	weinig vatbaar / 6
Virus A	niet getest / -
Virus X	vatbaar / 5
Virus Yn	weinig vatbaar / 7
Virus Yntn	weinig tot niet vatbaar / 8

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 20%, bij voorkeur in gedeelde gift
 Fosfaat: standaard advies
 Kalium: standaard advies

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.
 Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken. Voorkiemen alvorens het poten geeft een betere knolzetting.

Plantafstand

28/35: 20 cm (67000 planten/ha)
 35/50: 27 cm (50000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan een loofreactie geven en enige opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Agata vatbaar is.

Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdding is meestal voldoende, omdat Agata weinig gevoelig is voor rooibeschatiging en stootblauw.

Bewaring

Agata heeft een matige kiemrust, maar is geschikt voor lange bewaring in kisten bij 3 a 4 graden Celsius.

Say
 growth,
 say **Agrico.**

Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrico.nl

www.agrico.nl