


Een zeer vroeg consumptieras met een mooie huid, geschikt voor diverse grondsoorten.

- ✓ Crèmige vleeskleur
- ✓ Zeer vroege rijptijd
- ✓ Goede droogtetolerantie



Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Agrico Research B.V.
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2034
- ⦿ **Kruising:** SOLARA x FRESCO
- ⦿ **Zaailingnummer:** AR 93-0084

Marktsegment

- ⦿ **Traditioneel**

T

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	zeer vroeg / 8
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	gemiddeld / 6,5
Loof: - ontwikkeling volledig	vrij snel / 7
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7
Loof: - stevigheid plant	gemiddeld / 6

Vleeskleur	crème / 5
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	goed / 7,5
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	grof / 8
Knolvorm	ovaal lang
Regelmaat knolvorm	vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting	matig / 5
Regelmaat sortering	regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	vrij kort / 5
Metribuzin	gevoelig / 5
Bentazon	niet getest / -
Talent	5% tot 15% meer knollen / 6
Ethyleen	15% tot 25% meer knollen / 7

Doorwas	redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7
Rooibeschaadiging	redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht	355
Drogestofgehalte	19,5%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	2,8

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	onvoldoende / 4
Kooktype	vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring	niet getest / -
Grauwverkleuring (na koken)	weinig gevoelig / 7

Say potato,
say **Agrico.**

Arrow.

Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	zeer vatbaar / 4
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 7

Schurft	weinig vatbaar / 6
Poederschurft	vatbaar / 5
Fusarium	weinig vatbaar / 6
Erwinia	vatbaar / 5
Zwarte spikkel	weinig vatbaar / 7,5
Kringerigheid	weinig vatbaar / 6

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	weinig vatbaar / 7
Virus Yn	vatbaar / 5,5
Virus Yntn	weinig vatbaar / 7,5

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 10%, liefst gedeeld en de 2e gift tijdens de knolzetting.

Fosfaat: standaard advies

Kalium: standaard advies

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.

Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken. Voorkiemen alvorens het potten geeft een betere knolzetting.

Plantafstand

28/35: 20 cm (67000 planten/ha)

35/55: 25 cm (54000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin geeft vaak een loofreactie en enige opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Arrow vatbaar is.

Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdoding is meestal voldoende, omdat Arrow weinig gevoelig is voor stootblauw en vrij gevoelig voor rooibeschatiging.

Bewaring

Arrow heeft een zwakke kiemrust en is alleen geschikt voor af land levering en korte bewaring bij 4 graden Celsius.

Say
growth,
say **Agrico.**

Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl

www.agrigo.nl