

Kuras.

Een laat ras voor de zetmeelteelt met resistentie tegen aardappelmoeheid en een zeer goede zetmeelopbrengst.

- ✓ Witte vleeskleur
- ✓ Goede bewaarbaarheid
- ✓ Goede resistentie tegen virus en Phytophthora



Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** G. Kuper
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2023
- ⦿ **Kruising:** PG 285 x AR 69-0491
- ⦿ **Zaailingnummer:** KU 80-1271

Marktsegment

- ⦿ **Verwerkende industrie** | Zetmeel

P

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	laat / 4
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7
Loof: - ontwikkeling volledig	vrij snel / 7,5
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 5,5
Metribuzin	weinig gevoelig / 7
Bentazon	niet getest / -
Talent	15% tot 25% meer knollen / 7
Ethyleen	niet getest / -

Vleeskleur	wit / 4,5
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	gemiddeld / 5,5
Kiemkleur	donker blauw paars
Knolgrootte	vrij grof / 7,5
Knolvorm	rond ovaal
Regelmaat knolvorm	vrij regelmatig / 6
Knolzetting	gemiddeld / 6
Regelmaat sortering	regelmatig / 7

Doorwas	redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren	weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid	redelijk gevoelig / 6
Rooibeschaadiging	gevoelig / 5,5

Onderwatergewicht	490
Drogestofgehalte	25,9%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	33,8

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4,5
Frietkwaliteit	matig / 5,5
Kooktype	kruidig / C
Rauwverkleuring	niet getest / -
Grauwverkleuring (na koken)	zeer gevoelig / 4,5

Say potato,
say **Agrico.**

Kuras.

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	resistent* / 9*
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	weinig tot niet vatbaar / 8
Phytophthora knol	weinig tot niet vatbaar / 8

Schurft	vatbaar / 5,5
Poederschurft	weinig vatbaar / 6,5
Fusarium	weinig vatbaar / 7
Erwinia	vatbaar / 5
Zwarte spikkel	niet getest / -
Kringerigheid	weinig vatbaar / 6,5

Virus Bladrol	weinig vatbaar / 7
Virus A	weinig tot niet vatbaar / 9
Virus X	weinig tot niet vatbaar / 8,5
Virus Yn	weinig tot niet vatbaar / 8
Virus Yntn	weinig tot niet vatbaar / 9

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	matig vatbaar / 5
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 5%
 Fosfaat: standaard advies
 Kalium: standaard advies + 10%

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.
 Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken. Voorkiemen alvorens het poten geeft een betere knolzetting.

Plantafstand

28/35: 25 cm (54000 planten/ha)
 35/55: 30 cm (45000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan enige loofreactie geven maar zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, alhoewel Kuras vrij resistent is.

Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdding is meestal voldoende, omdat Kuras gevoelig is voor rooibeschatiging en vrij gevoelig voor stootblauw.

Bewaring

Kuras heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor de middenlange bewaring (6 maanden) bij 5 graden Celsius.

Say
 growth,
 say **Agrico.**

* Resultaten met een sterretje (*) zijn op basis van eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd.

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands
 Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands
 T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl
www.agrigo.nl

