

Een laat zetmeelras met een goede zetmeelopbrengst en brede wratziekte-resistenties.

- ✓ Vrij grove knollen
- ✓ Hoog onderwatergewicht
- ✓ Zeer brede resistenties



## Algemene kenmerken

- **Kweker:** J.L. Spijkman
- **Kwekersrecht EU:** 31-12-2045
- **Kruising:** KURAS x SERESTA
- **Zaailingnummer:** SA 05-0204

## Marktsegment

- **Verwerkende industrie** | Zetmeel

P

## Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	laat / 4,5
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7

Vleeskleur	crème / 5
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	vrij goed / 6
Kiemkleur	blauw paars
Knolgrootte	vrij grof / 7
Knolvorm	rond ovaal
Regelmaat knolvorm	vrij regelmatig / 6
Knolzetting	vrij hoog / 7
Regelmaat sortering	vrij regelmatig / 6

## Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 6
Metribuzin	weinig tot niet gevoelig / 8
Bentazon	weinig tot niet gevoelig / 8
Talent	15% tot 25% meer knollen / 7
Ethyleen	15% tot 25% meer knollen / 7

Doorwas	redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren	weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid	zeer gevoelig / 4
Rooibeschaadiging	gevoelig / 5

Onderwatergewicht	508
Drogestofgehalte	27%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	10,1

Chipskwaliteit	matig / 5
Frietkwaliteit	onvoldoende / 4
Kooktype	kruimig / C
Rauwverkleuring	niet getest / -
Grauwverkleuring (na koken)	zeer gevoelig / 4

Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	vatbaar / 4
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	weinig vatbaar / 6
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	vatbaar / 4

Phytophthora loof	weinig vatbaar / 6
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 6,5

Schurft	weinig vatbaar / 6
Poederschurft	weinig tot niet vatbaar / 8
Fusarium	/ -
Erwinia	niet getest / -
Zwarte spikkel	weinig vatbaar / 6,5
Kringerigheid	weinig vatbaar / 6

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	vatbaar / 5,5
Virus Yn	weinig tot niet vatbaar / 8
Virus Yntn	weinig tot niet vatbaar / 9

Wratziekte F1 (D1)	weinig vatbaar / 9
Wratziekte F6 (O1)	resistent / 10
Wratziekte F18 (T1)	weinig vatbaar / 9

Say  
growth,  
say **Agrico.**

## Bemesting<sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies + 5%  
Fosfaat: standaard advies  
Kalium: standaard advies + 20%

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

## Pootgoedbehandeling

Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken. Voorkiemen alvorens het poten geeft een betere knolzetting. Eventueel 1x afkiemen.

## Plantafstand

28/35: 27 cm (50000 planten/ha)

35/55: 33 cm (40000 planten/ha)

Het ras heeft lange stolonen, poot om deze reden het ras niet te diep.

## Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin levert geen problemen op.

## Schimmels

Een preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, alhoewel Allstar vrij weinig vatbaar is.

## Oogst

Allstar is gevoelig voor rooibeschatiging en stootblauw, indien mogelijk minimaal drie weken af laten harden.

## Bewaring

Allstar heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor de middenlange bewaring (6 maanden).

## Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl

[www.agrigo.nl](http://www.agrigo.nl)