

Premiere.

Rasbeschrijving consumptie / 1-2

Een zeer vroeg verwerkingsras met vroeg een goede opbrengst.

- ✓ Vroeg afluand te verwerken
- ✓ Hoog onderwatergewicht
- ✓ Goede drogestof verdeling



Algemene kenmerken

- **Kweker:** Precardi
- **Kwekersrecht EU:** verlopen
- **Kruising:** CIVA x PROVITA
- **Zaailingnummer:** Brands 68-15

Marktsegment

- **Verwerkende industrie** | Frites

P

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	zeer vroeg / 8
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	snel / 8
Loof: - ontwikkeling volledig	vrij snel / 7,5
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6,5
Loof: - stevigheid plant	gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	vrij kort / 5
Metribuzin	gevoelig / 5
Bentazon	redelijk gevoelig / 6
Talent	5% tot 15% meer knollen / 6
Ethyleen	niet getest / -

Vleeskleur	licht geel / 6
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	vrij goed / 6,5
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	gemiddeld / 6,5
Knolvorm	ovaal rond
Regelmaat knolvorm	vrij regelmatig / 6
Knolzetting	vrij hoog / 7
Regelmaat sortering	vrij regelmatig / 6

Doorwas	weinig gevoelig / 7
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid	redelijk gevoelig / 6
Rooibeschaadiging	redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht	416
Drogestofgehalte	22,4%
Drogestof verdeling	goed / 7,5
TGA - gehalte	2,8

Chipskwaliteit	matig / 5
Frietkwaliteit	gemiddeld / 6,5
Kooktype	kruimig / BC
Rauwverkleuring	gevoelig / 5,5
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6,5

Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	zeer vatbaar / 4
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 6

Schurft	zeer vatbaar / 4,5
Poederschurft	vatbaar / 5
Fusarium	weinig vatbaar / 6
Erwinia	vatbaar / 5
Zwarte spikkel	niet getest / -
Kringerigheid	weinig tot niet vatbaar / 8

Virus Bladrol	weinig vatbaar / 6
Virus A	weinig tot niet vatbaar / 9
Virus X	weinig tot niet vatbaar / 8
Virus Yn	vatbaar / 5,5
Virus Yntn	weinig vatbaar / 7,5

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies
Fosfaat: standaard advies
Kalium: standaard advies + 10%

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.
Kan vanuit de koeling worden gepoot.

Plantafstand

28/35: 27 cm (50000 planten/ha)
35/55: 33 cm (40000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin geeft vaak een loofreactie en enige opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Premiere zeer vatbaar is.

Oogst

Indien mogelijk minimaal twee weken wachten met rooien na loofdoding, omdat Premiere vrij gevoelig is voor rooibeschatiging en voor stootblauw.

Bewaring

Premiere heeft een vrij zwakke kiemrust en is alleen geschikt voor afluand levering en korte bewaring, de bakkwaliteit loopt snel achteruit.

Say
growth,
say **Agrico.**

Agrico