

Babylon.

Een laat, geelvezig verwerkingsras met een goede opbrengst en een zeer stabiele kwaliteit.

- ▶ Goede bakkwaliteit
- ▶ Brede virusresistenties
- ▶ Goede bewaarbaarheid



MARKTSEGMENT

T
Traditioneel

R
Retail
Vers

P
Verwerkende
industrie
Koelvers, Chips,
Frites

KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: R.K. Bakker
Kruising: AGRIA MUTANT
Zaailing: BA 06-0001
Kwekersrecht: 31-12-2046

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: laat / 5
Kiemkleur: blauw paars
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: zeer veel / 8
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6,5
Loof - stevigheid plant: stevig / 8

Vleeskleur: geel / 7
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolgrootte: grof / 8
Knolvorm: ovaal lang
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: lang / 8
Metribuzin: redelijk gevoelig / 6,5
Bentazon: weinig gevoelig / 7,5
Ethyleen: 5% minder tot 5% meer knollen / 5
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6
Rooibeschaadiging: gevoelig / 5,5

Onderwatergewicht: 401
Drogstofgehalte: 21,7%
Drogstofverdeling: goed / 7
TGA-gehalte: 5,2

Chipskwaliteit: goed / 7
Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Kooktype: kruimig / BC
Rauwverkleuring: weinig gevoelig / 7
Gruwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7



www.agrico.nl/babylon

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Eén keer afkiemen is optioneel.

Plantafstand

28/35 mm: 24-26 cm (54.000 planten/ha)

35/55 mm: 29-32 cm (44.000 planten/ha)

50/55 mm: 37-39 cm (35.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken en kan enige opbrengstderving geven.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema wordt geadviseerd.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoeding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor lange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: partieel resistent / 8

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: vatbaar / 5,5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5

Schurft: vatbaar / 5

Poederschurft: - / -

Fusarium: weinig vatbaar / 7

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: zeer vatbaar / 4,5

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6,5

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 7,5

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -