


Een midden vroeg, hoog opbrengend consumptieras met een zeer regelmatige knolvorm en een mooie schilhoedanigheid.

- ✓ Grove knollen
- ✓ Hoge knolzetting
- ✓ Regelmatige sortering



Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Lantmännen Seed B.V.
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2046
- ⦿ **Kruising:** ARIELLE x SOFIA
- ⦿ **Zaailingnummer:** SW 05-1431

Marktsegment

- ⦿ **Traditioneel**
- ⦿ **Retail** | Vers



Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden vroeg / 7
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	snel / 8
Loof: - ontwikkeling volledig	vrij snel / 7,5
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6
Loof: - stevigheid plant	gemiddeld / 6,5

Vleeskleur	licht geel / 6
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	goed / 7,5
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	vrij grof / 7,5
Knolvorm	ovaal rond
Regelmaat knolvorm	regelmatig / 7,5
Knolzetting	vrij hoog / 7
Regelmaat sortering	vrij regelmatig / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	vrij kort / 5
Metribuzin	redelijk gevoelig / 6,5
Bentazon	weinig tot niet gevoelig / 8
Talent	5% tot 15% meer knollen / 6
Ethyleen	5% minder tot 5% meer knollen / 5

Doorwas	redelijk gevoelig / 6,5
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7,5
Rooibeschaadiging	redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht	324
Drogestofgehalte	17,9%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	4,7

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	onvoldoende / 4,5
Kooktype	vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring	zeer gevoelig / 4
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6

Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	zeer vatbaar / 4,5
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 6

Schurft	vatbaar / 5
Poederschurft	zeer vatbaar / 4
Fusarium	vatbaar / 5,5
Erwinia	niet getest / -
Zwarte spikkel	vatbaar / 5
Kringrigheid	vatbaar / 5

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	niet getest / -
Virus Yn	weinig vatbaar / 6
Virus Yntn	weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	licht vatbaar* / 7*
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies
Fosfaat: standaard advies
Kalium: standaard advies

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Niet afkiemen.
Kan vanuit de koeling worden gepoot.

Plantafstand

28/35: 27 cm (50000 planten/ha)
35/55: 33 cm (40000 planten/ha)
Advies om Spectra wat dieper te poten met een goede rugbedekking om groenverkleuring te voorkomen.

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan een loofreactie geven en enige opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Spectra zeer vatbaar is.

Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdding is meestal voldoende, omdat Spectra vrij gevoelig is voor rooibeschatiging en weinig gevoelig voor stootblauw.

Bewaring

Spectra heeft een vrij zwakke kiemrust, maar kan goed worden bewaard (6 maanden), met behoud van kwaliteit, bij 4-5 graden Celsius.

Say
growth,
say **Agrico.**

* Resultaten met een sterretje (*) zijn op basis van eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd.

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands
Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands
T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl
www.agrigo.nl

