

Een midden vroeg, vrij vastkokend tafelras met een mooie huid en een goed onderwatergewicht.

- ✓ Prachtige uitstraling
- ✓ Midden vroege rijptijd
- ✓ Brede resistenties



Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Agrico Research B.V.
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2046
- ⦿ **Kruising:** AR 99-1184 x AR 98-1009
- ⦿ **Zaailingnummer:** AR 05-1176

Marktsegment

- ⦿ **Retail** | Vers

R

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden vroeg / 7
Bloemkleur	licht paars
Hoeveelheid bessen	vrij weinig / 5
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7,5
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	matig / 5
Loof: - stevigheid plant	gemiddeld / 6

Vleeskleur	licht geel / 6,5
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	goed / 7
Kiemkleur	blauw paars
Knolgrootte	vrij grof / 7
Knolvorm	ovaal rond
Regelmaat knolvorm	regelmatig / 7
Knolzetting	hoog / 8
Regelmaat sortering	vrij regelmatig / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 6
Metribuzin	weinig gevoelig / 7,5
Bentazon	weinig gevoelig / 7
Talent	25% meer knollen / 8
Ethyleen	5% minder knollen / 4

Doorwas	weinig gevoelig / 7
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7
Rooibeschatiging	gevoelig / 5,5

Onderwatergewicht	366
Drogestofgehalte	20%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	3,07

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	onvoldoende / 4
Kooktype	vrij kruimig / B
Rauwverkleuring	redelijk gevoelig / 6
Grauwverkleuring (na koken)	weinig gevoelig / 7

Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	vatbaar / 4
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	vatbaar / 5
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 6,5

Schurft	vatbaar / 5,5
Poederschurft	vatbaar / 5
Fusarium	vatbaar / 5
Erwinia	niet getest / -
Zwarte spikkel	zeer vatbaar / 4
Kringerigheid	weinig vatbaar / 6

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	niet getest / -
Virus Yn	weinig vatbaar / 6,5
Virus Yntn	weinig tot niet vatbaar / 8,5

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 20%, voor een voldoende rijp gewas.

Fosfaat: standaard advies

Kalium: standaard advies

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.

Kan vanuit de koeling worden gepoot.

Plantafstand

28/35: 22 cm (60500 planten/ha)

35/50: 27 cm (50000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan enige loofreactie geven maar zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Danique vrij vatbaar is.

Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdding is meestal voldoende, omdat Danique gevoelig is voor rooibeschatiging en weinig gevoelig voor stootblauw.

Bewaring

Danique heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor de middenlange bewaring (6 maanden) bij 5 graden Celcius.

Say
growth,
say **Agrico.**

Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl

www.agrigo.nl