

Amorosa.

Een midden vroeg, roodschillig consumptieras met een goede opbrengst.

- ✓ Grove knollen
- ✓ Goede droogtetolerantie
- ✓ Weinig gevoelig voor blauw en beschadiging



Algemene kenmerken

- ⊙ **Kweker:** Agrico Research B.V.
- ⊙ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2029
- ⊙ **Kruising:** ARINDA x IMPALA
- ⊙ **Zaailingnummer:** AR 87-0103

Marktsegment

- ⊙ **Traditioneel**

T

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden vroeg / 6,5
Bloemkleur	licht paars
Hoeveelheid bessen	vrij weinig / 5
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7
Loof: - ontwikkeling volledig	vrij snel / 7
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7
Loof: - stevigheid plant	gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	kort / 4
Metribuzin	redelijk gevoelig / 6
Bentazon	niet getest / -
Talent	5% minder knollen / 4
vanwege mutant vorming wordt gebruik van talent afgeraden	
Ethyleen	niet getest / -

Vleeskleur	licht geel / 6
Schilkleur	rood
Schilhoedanigheid	vrij goed / 6,5
Kiemkleur	blauw paars
Knolgrootte	grof / 8
Knolvorm	ovaal lang
Regelmaat knolvorm	regelmatig / 7
Knolzetting	matig / 5
Regelmaat sortering	regelmatig / 7

Doorwas	redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid	weinig tot niet gevoelig / 8
Rooibeschaadiging	weinig gevoelig / 7

Onderwatergewicht	349
Drogestofgehalte	19,2%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	-

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	matig / 5
Kooktype	vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring	niet getest / -
Grauwverkleuring (na koken)	gevoelig / 5

Say potato,
say **Agrico.**

Amorosa.

Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	zeer vatbaar / 4
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 7

Schurft	vatbaar / 5
Poederschurft	weinig vatbaar / 6
Fusarium	weinig tot niet vatbaar / 8
Erwinia	weinig vatbaar / 6
Zwarte spikkel	niet getest / -
Kringrigheid	vatbaar / 5

Virus Bladrol	weinig vatbaar / 6
Virus A	niet getest / -
Virus X	niet getest / -
Virus Yn	weinig vatbaar / 7
Virus Yntn	weinig vatbaar / 6,5

Wratziekte F1 (D1)	licht vatbaar / 8
Wratziekte F6 (O1)	weinig vatbaar / 9
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 10%, liefst gedeeld en de 2e gift tijdens de knolzetting.

Fosfaat: standaard advies

Kalium: standaard advies

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Maximaal 2x afkiemen.

Kan vanuit de koeling worden gepoot.

Plantafstand

28/35: 22-25 cm (54000 planten/ha)

35/55: 32-35 cm (40000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan een loofreactie geven en enige opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Amorosa vatbaar is.

Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdding is noodzakelijk, omdat Amorosa redelijk gevoelig is voor rooibeschatiging, maar niet gevoelig voor stootblauw.

Bewaring

Amorosa heeft een zwakke kiemrust en is alleen geschikt voor afluand levering en korte bewaring bij 4 graden Celsius.

Say
growth,
say **Agrico.**

Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl

www.agrigo.nl