

Een middenlaat consumptieras met een goede hitteresistentie en een hoge opbrengst.

- ✓ Midden late rijptijd
- ✓ Vrij lange kiemrust
- ✓ Weinig gevoelig voor blauw en beschadiging



## Algemene kenmerken

- ⊙ **Kweker:** F.J. Vos
- ⊙ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2037
- ⊙ **Kruising:** ARMUNDO x ARIELLE
- ⊙ **Zaailingnummer:** VO 96-0077

## Marktsegment

- ⊙ **Traditioneel**

T

## Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden laat / 6
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7,5
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7
Loof: - stevigheid plant	gemiddeld / 6,5

Vleeskleur	crème / 5
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	vrij goed / 6
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	vrij grof / 7,5
Knolvorm	lang ovaal
Regelmaat knolvorm	vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting	matig / 5
Regelmaat sortering	vrij regelmatig / 6,5

## Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	vrij lang / 7
Metribuzin	weinig tot niet gevoelig / 8
Bentazon	niet getest / -
Talent	5% minder knollen / 4
vanwege mutant vorming wordt gebruik van talent afgeraden	
Ethyleen	5% minder tot 5% meer knollen / 5

Doorwas	redelijk gevoelig / 6
Groeisceuren	redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid	weinig tot niet gevoelig / 8
Rooibeschaadiging	weinig gevoelig / 7

Onderwatergewicht	326
Drogestofgehalte	18,3%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	3,6

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	matig / 5,5
Kooktype	vrij kruimig / B
Rauwverkleuring	niet getest / -
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6

Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	vatbaar / 5
Phytophthora knol	vatbaar / 5

Schurft	weinig vatbaar / 6
Poederschurft	zeer vatbaar / 4,5
Fusarium	zeer vatbaar / 4
Erwinia	vatbaar / 5
Zwarte spikkel	vatbaar / 5,5
Kringrigheid	zeer vatbaar / 4

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	weinig tot niet vatbaar / 8
Virus Yn	weinig vatbaar / 7,5
Virus Yntn	weinig vatbaar / 6,5

Wratziekte F1 (D1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

## Bemesting<sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies + 5%  
Fosfaat: standaard advies  
Kalium: standaard advies

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

## Pootgoedbehandeling

Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken.

Voorkiemen alvorens het poten geeft een betere knolzetting. Eventueel 2x afkiemen.

## Plantafstand

28/35: 22 cm (60500 planten/ha)  
35/55: 27 cm (50000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin levert geen problemen op.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Faluka vatbaar is.

## Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdding is meestal voldoende, Faluka is weinig gevoelig voor rooibeschatiging en niet gevoelig voor stootblauw.

## Bewaring

Faluka heeft een goede kiemrust en is geschikt voor lange bewaring bij 5 graden Celsius.

Say  
growth,  
say **Agrico.**

## Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl

[www.agrigo.nl](http://www.agrigo.nl)