

# Twister.

Rasbeschrijving consumptie / 1-2



Een midden vroeg consumptieras, geschikt voor de gangbare en biologische teelt, met een goede opbrengst en Phytophthora resistentie in loof en knol.

- ✓ Mooie presentatie
- ✓ Goede bewaarbaarheid
- ✓ Vrij vastkokend

## Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** G.W. te Winkel
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2048
- ⦿ **Kruising:** ARG 96-0739 x AR 02-9113
- ⦿ **Zaailingnummer:** TW 08-1507

## Marktsegment

- ⦿ **Traditioneel**
- ⦿ **Retail** | Vers
- ⦿ **Geschikt voor de biologische teelt**



## Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden vroeg / 7
Bloemkleur	licht paars
Hoeveelheid bessen	vrij weinig / 5,5
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7
Loof: - ontwikkeling volledig	vrij snel / 7,5
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6,5
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7

Vleeskleur	licht geel / 6,5
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	goed / 7
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	vrij grof / 7
Knolvorm	rond ovaal
Regelmaat knolvorm	regelmatig / 7
Knolzetting	gemiddeld / 6
Regelmaat sortering	vrij regelmatig / 6,5

## Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	vrij lang / 7
Metribuzin	zeer gevoelig / 3
Bentazon	redelijk gevoelig / 6
Talent	15% tot 25% meer knollen / 7
Ethyleen	5% minder knollen / 4

Doorwas	redelijk gevoelig / 6,5
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid	weinig tot niet gevoelig / 8
Rooibeschaadiging	weinig gevoelig / 7

Onderwatergewicht	345
Drogestofgehalte	19%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	5,63

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	matig / 5
Kooktype	vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring	redelijk gevoelig / 6
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6,5

Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	weinig tot niet vatbaar / 9
Phytophthora knol	weinig tot niet vatbaar / 9

Schurft	weinig vatbaar / 6
Poederschurft	vatbaar / 5
Fusarium	weinig vatbaar / 6
Erwinia	niet getest / -
Zwarte spikkel	weinig vatbaar / 7
Kringerigheid	weinig vatbaar / 6

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	niet getest / -
Virus Yn	weinig tot niet vatbaar / 8
Virus Yntn	weinig tot niet vatbaar / 8

Wratziekte F1 (D1)	licht vatbaar / 8
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

## Bemesting<sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies +20%  
Fosfaat: standaard advies  
Kalium: standaard advies

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

## Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.  
Weinig verschil in diverse pootgoed behandelingen

## Plantafstand

28/35: 22 cm (60500 planten/ha)  
35/50: 25 cm (54000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin wordt afgeraden, dit geeft vaak een flinke loofreactie en forse opbrengstderving.

## Schimmels

Twister heeft een zeer goede Phytophthora resistentie in loof en knol.

## Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdoding is meestal voldoende, omdat Twister weinig gevoelig is voor rooibescha- diging en niet gevoelig voor stootblauw.

## Bewaring

Twister heeft een goede kiemrust en is geschikt voor midden- lange tot lange bewaring bij 5-6 graden Celsius.

Say  
growth,  
say **Agrico.**

## Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl

[www.agrigo.nl](http://www.agrigo.nl)