

Een middenlaat verwerkingsras voor koelverse aardappelproducten met een goede opbrengst en een hoog knolaantal.

- ✓ Vrij vastkokend
- ✓ Geschikt voor diverse grondsoorten
- ✓ Brede wratziekte resistentie



## Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Ver. Saatzuchten
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** verlopen
- ⦿ **Kruising:** OBERARNBACHER FRUHE x FLAVA
- ⦿ **Zaailingnummer:**

## Marktsegment

- ⦿ **Verwerkende industrie** | Koelvers

P

## Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden laat / 6
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	gemiddeld / 6
Loof: - ontwikkeling volledig	vrij snel / 7
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6
Loof: - stevigheid plant	gemiddeld / 6

Vleeskleur	licht geel / 6
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	vrij goed / 6,5
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	vrij grof / 7
Knolvorm	lang ovaal
Regelmaat knolvorm	regelmatig / 7
Knolzetting	hoog / 9
Regelmaat sortering	regelmatig / 7

## Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 6
Metribuzin	weinig tot niet gevoelig / 8
Bentazon	niet getest / -
Talent	niet getest / -
Ethyleen	niet getest / -

Doorwas	weinig tot niet gevoelig / 8
Groeischeuren	weinig tot niet gevoelig / 8
Blauwgevoeligheid	gevoelig / 5
Rooibeschatiging	weinig gevoelig / 7

Onderwatergewicht	400
Drogestofgehalte	22,1%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	5

Chipskwaliteit	matig / 5
Frietkwaliteit	gemiddeld / 6
Kooktype	vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring	redelijk gevoelig / 6
Grauwverkleuring (na koken)	weinig gevoelig / 7

Say potato,  
say **Agrico.**

# Hansa.

## Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	zeer vatbaar / 4
Phytophthora knol	zeer vatbaar / 4

Schurft	vatbaar / 5,5
Poederschurft	niet getest / -
Fusarium	vatbaar / 5
Erwinia	weinig vatbaar / 6
Zwarte spikkel	niet getest / -
Kringerigheid	weinig vatbaar / 7

Virus Bladrol	vatbaar / 5
Virus A	weinig tot niet vatbaar / 9
Virus X	niet getest / -
Virus Yn	zeer vatbaar / 4
Virus Yntn	niet getest / -

Wratziekte F1 (D1)	licht vatbaar / 8
Wratziekte F6 (O1)	weinig vatbaar / 9
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

## Bemesting<sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies + 5%  
 Fosfaat: standaard advies  
 Kalium: standaard advies + 20%

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

## Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.  
 Goede kiemstimulering (warmtestoot) om dominantie te verbreken.

## Plantafstand

28/35: 20 cm (67000 planten/ha)  
 35/50: 25 cm (54000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin levert geen problemen op.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat loof als knol zeer vatbaar is.

## Oogst

Minimaal drie weken wachten met rooien na loofdoding, omdat Hansa gevoelig is voor stootblauw, maar niet gevoelig voor rooibeschatiging.

## Bewaring

Hansa heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor de middenlange bewaring (6 maanden) bij 4 graden Celsius. Voor verwerkingsdoeleinden niet beneden 7 graden Celsius bewaren.

Say  
 growth,  
 say **Agrico.**

## Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl

[www.agrigo.nl](http://www.agrigo.nl)