

Sante.

MARKTSEGMENT



Traditioneel



Retail
Vers

Een middenlaar consumptieras met een goede opbrengst.

- ▶ Hoog onderwatergewicht
- ▶ Vrij kruimig
- ▶ Brede resistenties



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: J. Vegter
Kruising: WY 66-13-636 x AM 66-0042
Zaailing: VE 72-13-225
Kwekersrecht: Verlopen

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenlaar / 6
Kiemkleur: rood paars
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: geen / 4
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5
Loof - selecteerbaarheid: vrij makkelijk / 7
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolgrootte: vrij grof / 7
Knolvorm: ovaal rond
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6
Knolzetting: vrij hoog / 7
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: gemiddeld / 6
Metribuzin: redelijk gevoelig / 6
Bentazon: - / -
Ethyleen: - / -
Talent: 5% minder knollen / 4

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Groescheuren: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7,5
Rooibeschatiging: redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht: 425
Drogstofgehalte: 22,9%
Drogstofverdeling: - / -
TGA-gehalte: 3,9

Chipskwaliteit: niet geschikt / 5
Frietkwaliteit: gemiddeld / 6
Kooktype: vrij kruimig / B
Rauwverkleuring: - / -
Gruwverkleuring (na koken): gevoelig / 5,5



www.agrico.nl/sante

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken en kan enige opbrengstderving geven.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: partieel resistent / 7

Aardappelmoeheid Pa 2: partieel resistent / 7

Aardappelmoeheid Pa 3: vatbaar / 3

Phytophthora loof: vatbaar / 5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7

Schurft: vatbaar / 5

Poederschurft: weinig tot niet vatbaar / 8

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Erwinia: vatbaar / 5

Zwarte spikkel: vatbaar / 5,5

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 7

Virus - A: weinig tot niet vatbaar / 9

Virus - X: weinig tot niet vatbaar / 9

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8,5

Virus - Yntn: weinig tot niet vatbaar / 9

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -