

Een middenlaat consumptieras met een goede opbrengst.

- ✓ Hoog onderwatergewicht
- ✓ Vrij kruimig
- ✓ Brede resistenties



Algemene kenmerken

- **Kweker:** J. Vegter
- **Kwekersrecht EU:** verlopen
- **Kruising:** WY 66-13-636 x AM 66-0042
- **Zaailingnummer:** VE 72-13-225

Marktsegment

- **Traditioneel**
- **Retail** | Vers



Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden laat / 6
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7
Loof: - ontwikkeling volledig	vrij snel / 7,5
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 6
Metribuzin	redelijk gevoelig / 6
Bentazon	niet getest / -
Talent	5% minder knollen / 4
Ethyleen	vanwege mutant vorming wordt gebruik van talent afgeraden niet getest / -

Vleeskleur	licht geel / 6
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	vrij goed / 6
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	vrij grof / 7
Knolvorm	ovaal rond
Regelmaat knolvorm	vrij regelmatig / 6
Knolzetting	vrij hoog / 7
Regelmaat sortering	vrij regelmatig / 6,5

Doorwas	redelijk gevoelig / 6,5
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7,5
Rooibeschaadiging	redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht	425
Drogestofgehalte	22,9%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	3,9

Chipskwaliteit	matig / 5
Frietkwaliteit	gemiddeld / 6
Kooktype	vrij kruimig / B
Rauwverkleuring	niet getest / -
Grauwverkleuring (na koken)	gevoelig / 5,5

Say potato,
say **Agrico.**

Sante.

Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	partieel resistent / 7
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	partieel resistent / 7
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	vatbaar / 3

Phytophthora loof	vatbaar / 5
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 7

Schurft	vatbaar / 5
Poederschurft	weinig tot niet vatbaar / 8
Fusarium	weinig vatbaar / 6
Erwinia	vatbaar / 5
Zwarte spikkel	vatbaar / 5,5
Kringerigheid	weinig vatbaar / 6

Virus Bladrol	weinig vatbaar / 7
Virus A	weinig tot niet vatbaar / 9
Virus X	weinig tot niet vatbaar / 9
Virus Yn	weinig tot niet vatbaar / 8,5
Virus Yntn	weinig tot niet vatbaar / 9

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies
 Fosfaat: standaard advies
 Kalium: standaard advies

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.
 Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken. Voorkiemen alvorens het poten geeft een betere knolzetting.

Plantafstand

28/35: 25 cm (54000 planten/ha)
 35/55: 30 cm (45000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan een loofreactie geven en enige opbrengstderving.

Schimmels

Een preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Sante vatbaar is.

Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdding is meestal voldoende, omdat Sante weinig gevoelig voor stootblauw en vrij gevoelig voor rooibeschatiging.

Bewaring

Sante heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor de korte tot middenlange bewaring (4 maanden).

Say
 growth,
 say **Agrico.**

Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands
 Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands
 T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl
www.agrigo.nl